Usuario: Ángel García García
Teléfono: 651583047
E-Mail: aglgarcia1@yahoo.es

ID

613

TÍTULO DEL TRABAJO

DIFERENCIAS EN EL CONTROL DE LA PA. DISCREPANCIAS ENTRE TRES MÉTODOS DE MEDIDA.

UNIDAD DOCENTE

Unidad de Investigación CS La Alamedilla

CIUDAD

Salamanca

COMUNIDAD AUTÓNOMA

Castilla y León

OTROS AUTORES

1º AUTOR

NOMBRE: Ángel

APELLIDOS: García García

2º AUTOR

NOMBRE: Luis Javier

APELLIDOS: González Elena

3º AUTOR

NOMBRE: Javier

APELLIDOS: Parra Sánchez

4º AUTOR

NOMBRE: Luis

APELLIDOS: García Ortiz

5º AUTOR

NOMBRE: Manuel Ángel

APELLIDOS: Gómez Marcos

6º AUTOR

NOMBRE: Yolanda

APELLIDOS: Castaño Sánchez

PALABRAS CLAVE

PALABRAS CLAVE 1: hipertension

PALABRAS CLAVE 2: Blood Pressure Monitoring, Ambulatory

PALABRAS CLAVE 3: office blood pressure

FORMA DE PRESENTACIÓN

POSTER

ACTIVIDAD CIENTÍFICA A LA QUE SE DIRIGE

LIBRE

TIPO DE PRESENTACIÓN

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA

RESUMEN

OBJETIVOS

Evaluar la relación existente entre el control de pacientes hipertensos en función de la medida con AMPA, MAPA o en consulta. Analizar concordancias entre cada uno de ellos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño, ámbito de realización y marco o nivel de atención sanitaria, criterios de selección, número de sujetos incluidos, número de sujetos que esponden y abandonos, intervenciones (si procede), variables y métodos de evaluación de la respuesta

Diseño: Estudio descriptivo trasversal.

Sujetos y ámbito: 241 hipertensos incluidos por muestreo consecutivo, pertenecientes a dos centros de salud.

Variables: Sexo, edad, PA medida con MAPA, AMPA y PAC.

Criterios control establecidos por las sociedades europeas de cardiología e hipertensión en 2.007: PAC < 140/90 mmHg, MAPA: Pamedia < 125-130/80 mmHg, PA actividad < 130-135/85 mmHg, PA reposo < 120/75 mmHg, AMPA Pamedia < 130-135/85 mmHg.

RESULTADOS

Edad media fue de 63,71 años (: 62,01; : 65,22, p=0,042). 53,1% son mujeres.

Valores medios fueron: PAC 1º toma 155,87/87,56 mmHg ; 2º toma 150,68/86,37mmHg; AMPA: 1º toma 138,3/78,44mmHg; 2º toma 132,22/76,79mmHg; MAPA: 24 horas 124,67/73,9mmHg, actividad 128,47/77,59mmHg y reposo 115,48/65,59mmHg (P<0,05).

El porcentaje de hipertensos controlados, con PAC fue 27,4%, tomando el valor menor propuesto por la sociedad europea de hipertensión en la AMPA, fue de 43,93%, y de 56,07% con el superior. Medidas con MAPA, la Pamedia está controlada en un 43,7% con el límite inferior, y en un 60,99% con el superior. En el periodo de actividad, 51,45% con el inferior y 63,9% con el superior. En el periodo de descanso están controlados el 55,6%.

CONCLUSIÓN

Existen discrepancias en cuanto al control de la HTA en función del método de medida empleado, la PAC es significativamente más elevada que la obtenida con MAPA y AMPA y el nivel de control es peor si se utiliza sólo este criterio.

C/ del Pi, 11 - 2ª Pl., Of. 13 - 08002 Barcelona
Tel. 93 317 71 29 - Fax: 93 318 69 02
congresos@semfyc.es